310000 00563-2017

上海恩维恩生物科技有限公司企业标准

Q/AXLT0001S-2017

代替 Q/AAXS0001S-2014

小流通牌小流通胶囊

2017-02-22发布

2017-03-08实施

上海恩维恩生物科技有限公司 发布

前 言

本标准依据《中华人民共和国食品安全法》、国家食品药品监督管理《国产保健食品批准证书》(产品名称:小流通胶囊,国食健字 G20030049)和 GB16740《食品安全国家标准 保健食品》等规定,特制定本企业标准,作为组织生产和对本产品质量进行控制和判断的依据。

本标准自实施之日起代替 Q/AAXS0001S-2014。

本标准与 Q/AAXS0001S-2014 相比,主要变化如下:

- 修改了规范性引用文件、感官要求、微生物限量、功效成分指标;
- 删除 5 检验方法;
- 删除 6 检验规则。

本标准由上海恩维恩生物科技有限公司提出。

本标准起草单位:上海恩维恩生物科技有限公司。

本标准主要起草人:魏莉。

本标准所代替标准的历次版本:

- Q/SMIX01-2003;
- Q/AAXS0001S-2014。

Q B

小流通牌小流通胶囊

1 范围

本标准规定了小流通牌小流通胶囊的要求、检验方法、生产加工过程的卫生要求、标识、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以三七、芦荟、益母草为原料，经过提取、配料、粉碎、干燥、装囊、包装等工艺精制而成，具有调节血脂、改善胃肠道功能（润肠通便）保健功能的小流通牌小流通胶囊。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 三七：应符合《中华人民共和国药典》2015 版一部---三七项下规定。

3.1.2 芦荟：应符合《中华人民共和国药典》2015 版一部---芦荟项下规定。

3.1.3 益母草：应符合《中华人民共和国药典》2015 版一部---益母草项下规定。

3.1.4 空心胶囊：应符合《中华人民共和国药典》2015 版的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色 泽	黄褐色	取适量试样置于 50mL 烧杯或白色瓷盘中，在自然光下观察色泽和状态。嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味
滋味、气味	辛、香、苦甜味	
状 态	色泽均匀，干燥，不粘结成团状，无肉眼可见杂质	

3.3 理化指标

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
水 分 / %	≤ 10.0	GB 5009.3
灰 分 / %	≤ 5.0	GB 5009.4
黄曲霉素 B ₁ μg/kg	不得检出	GB/T 5009.22

3.4 污染物限量

铅应符合表 3 的规定，其他污染物限量应符合 GB16740 的规定。

表 3 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
铅 (Pb) mg/kg	≤ 1.5	GB 5009.12

3.5 微生物限量

微生物限量应符合 GB16740 的规定。

3.6 功效成分指标

功效成分指标应符合表 3 的要求。

表 3 功效成分指标

项 目	指 标	检 验 方 法
总皂甙(以人参皂甙 Re 计) g/100g $\geq$	9.8	附录 A
芦荟苷 g/100g $\geq$	3.6	附录 B

3.7 净含量

产品规格：0.5g/粒。

按国家质量监督检验检疫总局令[2005]年第 75 号《定量包装商品计量监督管理办法》执行,按 JJF1070 规定的方法检验。

4 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 17405、GB 14881 的规定。

5 标识、包装、运输和贮存

5.1 标识

产品标签应符合卫生部《保健食品标识规定》、保健食品批准证书和 GB 7718、GB16740 等相关法规的规定，包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

5.2 包装

5.2.1 铝箔应符合 GB 12255 的规定，药用聚氯乙烯（PVC）硬片应符合 GB 5663 的规定，外纸箱应符合 GB/T 6543 的规定。

5.2.2 每粒净重 0.5g。

5.2.3 包装盒上应有清晰的保健食品标志、保健食品批准文号、产品名称、生产企业名称、生产日期、保质期、功效成分、适宜人群、食用方法、贮存方法等。

5.3 运输

运输产品的箱体必须符合食品卫生的要求，在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋受潮。不得与有毒有害物质混运。

5.4 贮存

产品应贮存在阴凉、通风、干燥处，仓库应保持清洁，不得与有毒物质混贮。环境温度不应高于 30℃，相对湿度应不大于 75%。

在符合本标准规定条件下，自生产之日起，保质期为 24 个月。

附录 A
(规范性附录)
总皂甙的测定方法

1. 试剂

- 1.1 Amborlite-XAD-2 大孔树脂：Sigma 化学公司、U.A.S。
- 1.2 正丁醇：分析纯
- 1.3 乙醇：分析纯
- 1.4 中性氧化铝：层析用，100-200 目。
- 1.5 人参皂甙 Re：购自中国药品生物制品检定所。
- 1.6 香草醛溶液：称取 5g 香草醛，加冰乙酸溶解并定容至 100ml。
- 1.7 高氯酸：分析纯
- 1.8 冰乙酸：分析纯
- 1.9 人参皂甙 Re 标准溶液：精确称取人参皂甙 Re 标准品 0.020g，用甲醛溶解并定容至 10ml，即每毫升含人参皂甙 Re 2mg。

2. 仪器

- 2.1 比色剂
- 2.2 层析柱

3. 实验步骤

3.1 样品处理：称取 1.000g 左右的样品（根据样品含人参量多少而定），放 100ml 容量瓶中，加少量水，超声 30min，再用水定容至 100ml，摇匀，放置，吸取上清液 10ml 进行柱层析。

3.2 柱层析：用 10ml 注射器作层析柱，内装 3cm 高的 Amborlite-XAD-2 大孔树脂，上加 1cm 高的中性氧化铝。先用 25ml 70%乙醇洗柱，弃去洗脱液，再用 25ml 水洗柱，弃去洗脱液，精确加入 1.0ml 已处理好的样品溶液（见 3.1），用 25ml 的水洗柱，以洗去糖分等水溶性杂质，弃去洗脱液，用 25ml 70%乙醇洗脱人参皂甙，收集洗脱液于蒸发皿中，放水浴挥干，以此作显色用。

3.3 显色：在上述已挥干的蒸发皿中准确加入 0.2ml 5%香草醛冰乙酸溶液，转动蒸发皿，使残渣都溶解，再加 0.8ml 高氯酸，混匀后移入 5ml 带塞刻度离心管中，放在 60℃以下的水浴上加温 10min，取出，冰浴冷却后，准确加入冰乙酸 5.0ml，摇匀后，以 1cm 比色池于 560nm 波长处与标准管一起进行比色测定。

3.4 标准管：吸取人参皂甙 Re 标准溶液（2.0mg/ml）100ul 放蒸发皿中，放在水浴挥干（低于 60℃），或热风吹干（勿使过热），处理方法与样品相同，测定吸光度值。

4. 计算：

$$X = A_1 / A_2 \times C \times V \times 100 / m / 1000 / 1000$$

式中：X：样品中人参总皂甙量（以人参皂甙 Re 计 g/100g）

A₁：被测液的吸光度值。

A₂：标准液的吸光度值。

C：标准管人参皂甙 Re 的量，ug

V：样品稀释体积，ml。

M：样品质量，g

附录 B
(规范性附录)
芦荟苷的测定方法

1. 范围

本标准规定了芦荟胶囊、芦荟片剂、芦荟汁等食品中芦荟苷含量的测定方法。

本标准适用于芦荟胶囊、芦荟片剂、芦荟汁等食品中芦荟苷含量的测定。

本方法的最低检出量 10ng

本方法的最佳线性范围：在标准溶液 0-100ug/ml $y=1124194x\div 3215$ ；线性关系 $r=0.9999$ 。

2. 方法原理

用甲醇+水 (55+45) 作为溶剂，提取试样中的芦荟苷，经高效液相色谱仪 C_{18} 柱分离，紫外检测器 293nm 条件下检测，以芦荟苷保留时间定性，峰面积定量。

3. 试剂

3.1 甲醇：色谱纯

3.2 水：重蒸水

3.3 芦荟苷标准品：中国药品生物制品鉴定所，化学对照品：纯度 $\geq 98\%$

3.4 芦荟苷标准溶液的制备：精确称取芦荟苷标准品 10mg，加流动相甲醇+水 (55+45) 溶解并移入 100ml 容量瓶中，定容至刻度。

4. 仪器设备

4.1 高效液相色谱仪 附紫外检测器

4.2 色谱柱 C_{18} (以十八烷基键合硅胶填料为填充剂) 或具同等性能的色谱柱，150mm $\times$ 6mm，5 μ m；

4.3 超声波清洗器：

4.4 C_{18} 净化富集柱：河北省津杨滤材厂， C_{18} 预柱 装量 0.5g，分配型；

4.5 离心机：3000r/min。

5. 色谱分离条件

5.1 流动相：甲醇+水(55+45)混匀,超声脱气;

5.2 流速：1ml/min；

5.3 柱温：40 $^{\circ}$ C；

5.4 检测波长：293nm；

5.5 灵敏度 0.016AUFS；

5.6 进样量 10 μ l。

6. 分析步骤

6.1 样品制备：将固体试样粉碎成粉末状，混匀。准确称取上述经处理后的试样 1.00g 于 50ml 容量瓶中，加检测用流动相 30ml 溶解，经超生振提 5min；加流动相定容 50ml，离心沉淀，上清液经滤膜 (0.45 μ m) 过滤。

6.2 测定步骤：分别精密吸取标准溶液和试样溶液 10 μ l 注入高效液相色谱仪，依上述色谱条件，以

保留时间定性，用外标法计算样品中芦荟苷的含量。

7. 计算公式

$$X = \frac{A_1 \times C \times V}{A_2 \times m}$$

式中：X——芦荟苷 g/g (mg/ml) ；

A₁——样品中芦荟苷的峰面积；

C——标准液的质量浓度，mg/ml；

A₂——标准液中芦荟苷的峰面积；

V——样品定容体积，ml；

M——样品质量，g (ml)。

结果允许误差：

同一样品两次测定值之差不超过两次测定平均值的 10%。

上海市食品安全企业标准备案承诺书

本食品生产企业承诺：

本次备案的企业标准为：小流通牌小流通胶囊(Q/AXLT0001S-2017)

一、本备案中所填写的内容，所提交的备案资料均真实，如有不实之处，本单位承担全部法律责任。

二、所提交备案的食品安全企业标准内容符合《食品安全法》及相关法律法规的规定，并严于食品安全国家标准或上海市食品安全地方标准的要求。

法定代表人（签字）：

上海恩维恩生物科技有限公司（盖章）

年 月 日